With MetS	Without MetS	Total
Chlorthalidone		
		
HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 0.97 (0.64-1.48)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 0.91 (0.44-1.89)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 0.96 (0.66-1.37)
Amlodipine		
		
HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 1.30 (0.70-2.39)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 0.97 (0.35-2.65)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 1.14 (0.69-1.90)
Lisinopril		
		
HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 1.48 (0.78-2.78)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 1.30 (0.40-4.19)	HR Diabetic/Nondiabetic (95% CI)* = 1.31 (0.76-2.26)

* Adjusted for treatment group, 2-year blood pressure, age, race, sex, smoking status, baseline fasting glucose level, baseline body mass index, 2-year serum potassium level, and atenolol and statin administration at 2 years. There are no statistically significant differences in the effect of incident diabetes between participants with and participants without MetS.